

COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA

PENTATOMÍDEOS CAPTURADOS EM ARMADILHA LUMINOSA,  
EM SANTA MARIA, RS, BRASIL<sup>1</sup>

D. LINK<sup>2</sup> J. GRAZIA<sup>3</sup>

ABSTRACT

Pentatomids captured with blacklight trap  
at Santa Maria, RS, Brazil

Thirty species of Pentatomidae (Heteroptera) belonging to the subfamilies Pentatominae, Edessinae, and Discocephalinae were captured with a light trap equiped with a ultraviolet lamp F15T<sub>8</sub>BL, from August 1971 to September 1974, at Santa Maria. Six new records for Rio Grande do Sul were obtained.

Durante os levantamentos de insetos da família Noctuidae (Lepidoptera) (CARVALHO et alii, 1971; TARRAGÓ et alii, 1975; LINK, 1977) e Scarabeoidea (Coleoptera) (LINK, 1976), feitos no período de agosto de 1971 a setembro de 1974, diversos espécimes da família Pentatomidae foram coletados.

Os valores obtidos nestas coletas acham-se no Quadro 1. Comparando os valores com aqueles obtidos por outros métodos de levantamento realizados na mesma época e na mesma área (COSTA & LINK, 1974 e 1977; LOPES et alii, 1974) conclui-se que a armadilha luminosa não serve para estimar populações de Pentatomidae.

Os pentatomídeos foram identificados pelo segundo autor. Seis espécies correspondem a novos registros para o Rio Grande do Sul: *Acrosternum difficile* (Stål, 1860); *A. longicorialis* Breddin, 1901; *Janeirona bergi* (Kormilev, 1956); *Miopygium grossa* Ruckes,

Recebido em 03/01/83.

<sup>1</sup> Parte do Projeto "Entomofauna de Santa Maria e arredores".

<sup>2</sup> Departamento de Defesa Fitossanitária, Centro de Ciências Rurais, UFSM. 97100-Santa Maria, RS.

<sup>3</sup> Departamento de Zoologia, UFRGS, Av. Paulo Gama s/nº. 90000 - Porto Alegre, RS. Bolsista do CNPq.

1958; *Serdia (Serdia) concolor* Ruckes, 1958 e *Tibilis compascens* Bergroth, 1914.

QUADRO 1- Espécies de Pentatomidae coletadas com o uso de armadilhas luminosas, em Santa Maria, RS; número de indivíduos por sexo e total por espécie.

Pentatominae	♂	♀	Total
<i>Acrosternum difficilis</i> (Stål, 1860)	0	1	1
<i>Acrosternum longicorialis</i> Breddin, 1901	1	0	1
<i>Arvelius albopunctatus</i> (De Geer, 1773)	1	1	2
<i>Banasa</i> sp. 1	12	8	20
<i>Banasa</i> sp. 2	3	2	5
<i>Banasa</i> sp. 3	4	2	6
<i>Dichelops (Neodichelops) melacanthus</i> (Dallas, 1851)	0	1	1
<i>Glyphepomis adroguensis</i> Berg, 1891	1	0	1
<i>Glyphepomis setigera</i> Kormilev & Pirán, 1952	2	1	3
<i>Janeirona bergi</i> (Kormilev, 1956)	0	1	1
<i>Janeirona</i> sp.	0	1	1
<i>Loxa deducta</i> Walker, 1867	1	4	5
<i>Mayrinia curvidens</i> (Mayr, 1864)	39	32	71
<i>Mormidea v-lutea</i> (Lichtenstein, 1796)	0	1	1
<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	74	66	140
<i>Oebalus griseescens</i> (Sailer, 1944)	6	8	14
<i>Oebalus poecilus</i> (Dallas, 1851)	202	172	374
<i>Oebalus ypsilonlongriseus</i> (De Geer, 1773)	2	45	47
<i>Pallantia macula</i> (Dallas, 1851)	0	1	1
<i>Piezodorus guildinii</i> (Westwood, 1837)	1	0	1
<i>Serdia (Brasiliicola) calligera</i> Stål, 1860	0	1	1
<i>Serdia (Serdia) concolor</i> Ruckes, 1958	2	1	3
<i>Serdia</i> sp.	1	5	6
<i>Thyanta</i> sp. 1	1	2	3
<i>Thyanta</i> sp. 2	0	1	1
<i>Tibilis compascens</i> Bergroth, 1914	1	1	2
<hr/>			
Edessinae			
<i>Edessa meditabunda</i> (Fabricius, 1794)	2	1	3
<i>Edessa</i> sp.	0	1	1
<hr/>			
Discocephalinae			
<i>Eurystethus</i> sp.	0	1	1
<i>Miopygium grossa</i> Ruckes, 1958	0	3	3
<hr/>			
30 spp.	356	364	720

Comunicação Científica

LITERATURA CITADA

- CARVALHO, S.; TARRAGÓ, M.F.S.; LINK, D. Captura de noctuídeos a través de armadilha luminosa: Resultados preliminares. Revta Cent. Cienc. Rur. S. Maria, 1(3):15-22, 1971.
- COSTA, E.C. & LINK, D. Incidência de percevejos em soja. Revta Cent. Cienc. Rur. S. Maria, 4(4):397-400, 1974.
- COSTA, E.C. & LINK, D. Efeito do ataque de *Piezodorus guildinii* em duas variedades de soja. Revta Cent. Cienc. Rur. S. Maria, 7(2):141-148, 1977.
- LINK, D. Abundância relativa e fenologia de alguns Scarabaeoidea fototácticos na zona de campos de Santa Maria, RS (Coleoptera). Curitiba, Univ. Fed. Paraná, Dep. Zool., 1976. 79p. (Tese de Dou toramento).
- LINK, D. Abundância relativa de alguns Noctuidae em armadilha lumínosa, em Santa Maria, RS. Revta Cent. Cienc. Rur. S. Maria, 7(4):331-351, 1977.
- LOPES, O.J.; LINK, D.; BASSO, I.V. Pentatomídeos de Santa Maria - Lista preliminar de plantas hospedeiras. Revta Cent. Cien. Rur. S. Maria, 4(4):317-322, 1974.
- TARRAGÓ, M.F.S.; CARVALHO, S.; LINK, D. Levantamento da família Noctuidae através de armadilhas luminosas, em Santa Maria, Rs. Revta Cent. Cienc. Rur. S. Maria, 5(2):125-130, 1975.