

NOVA ESPÉCIE DE *Scaphoidula* OSBORN, 1923 (HOMOPTERA:
CICADELLIDAE)¹

Keti M.R. Zanol²

ABSTRACT

A new species of *Scaphoidula* Osborn, 1923 (Homoptera:
Cicadellidae).

Scaphoidula rubrocincta, sp.n., from Paraguai is described.

RESUMO

Nova espécie do gênero *Scaphoidula* Osborn, 1923 (Homoptera: Cicadellidae), do Paraguai, é descrita: *S. rubrocincta*, sp.n.

INTRODUÇÃO

As espécies do gênero *Scaphoidula* são muito semelhantes quanto ao seu aspecto externo sendo diferenciadas pelos caracteres internos da genitália do macho e pelo formato da placa subgenital da fêmea.

ZANOL (1988), ao rever o gênero, descreveu três espécies novas: *S. omani*, *S. spinosa* e *S. mourei*; o macho de *S. confusa*

Recebido em 13/6/89

¹ Contribuição nº 649 do Departamento de Zoologia, CIIF, Universidade Federal do Paraná, CP 19030, 81504 Curitiba, Paraná, Brasil.

² Bolsista do CNPq, Proc. nº 301001/86.

Menezes, 1973 e a genitália interna do macho de *S. dentata* Oman, 1937 também foram descritas, passando o gênero a compor oito espécies, todas da Região Neotropical. Acrescenta-se, neste trabalho, uma nova espécie, *S. rubrocincta*, sp.n., do Paraguai.

Scaphoidula rubrocincta, sp.n.

Holótipo fêmea. Cabeça, em vista dorsal, mais longa medianamente, mais larga que o pronoto. Ocelos situados na margem anterior, perto dos olhos, visíveis de cima. Área ocelocular aproximadamente três vezes menor que o diâmetro dos ocelos. Sutura coronal atingindo a metade do vértice. Coloração geral marfim com duas faixas transversas, acompanhando a curvatura da cabeça, uma sobre o disco, marrom-avermelhada e outra, mais estreita, entre os ocelos, marrom-escura. Face mais ou menos achatada e ampla de coloração geral marfim; duas faixas transversas, paralelas, marrom-escuras: uma situada logo abaixo dos ocelos e a outra acima dos alvéolos antenais; uma faixa transversa, de cada lado, abaixo dos olhos, que se estende desde a sutura frontoclipeal até a borda, marrom-escura. Frontoclípeo levemente túmido. Anteclipeo com ápice alargado. Genas com bordos sinuosos e reentrância abaixo dos olhos. Pronoto de superfície lisa e coloração marfim com duas faixas transversas, paralelas às da cabeça, marrom-avermelhadas: a anterior mais curta e escura, atingindo a metade dos olhos e, a posterior, sobre o disco, com os bordos voltados para baixo antes de atingir as margens laterais. Escutelo marfim com duas faixas transversas marrom-avermelhadas: a anterior na base, junto ao pronoto e a posterior, logo abaixo da sutura. Tégminas com duas células anetapocais, semitransparentes, com linhas longitudinais marrom-escuras ao longo da Média, sutura claval e margem anal até a altura do apêndice; mais três oblíquas entre aquelas ao longo da Média e sutura claval, na altura da célula braquial e também outras menores junto as células apicais; ápice marrom. Venação distinta mostrando-se marfim em algumas partes. Apêndice desenvolvido. Espinulação das tíbias anteriores 1+4 e dos fêmures posteriores 2+2+1. Placa subgenital (Fig. 1) mais larga que longa; margem posterior com projeção mediana e uma pequena fenda no meio, formando dois dentes arredondados.

Macho: desconhecido.

Medidas (em mm). Comprimento total 5,70; largura da cabeça 1,54; largura do pronoto 1,46.

Material examinado: Holótipo de "Paraguay, Herr e Budgett. Brit. Mus. 1931-590", depositado no British Museum, Londres.

LITERATURA CITADA

- ZANOL, K.M.R. As espécies do gênero *Scaphoidula* Osborn, 1923 (Homoptera: Cicadellidae). *Revta bras. Ent.* 32(3/4): 416-422, 1988.




FIGURA 1. Placa subgenital de *Scaphoidula rubrocincta*, sp.n.